

## Directives pour les symptômes généraux - Pour les maladies spécifiques - contactez l'infirmière de votre école

Fièvre	COVID 19, Grippe, VRS	Symptômes du rhume Congestion, écoulement nasal, toux sans fièvre, maux de gorge, vomissements, diarrhée, éruption cutanée					Angine streptococcique ou Scarlatine	Œil Infection	Hôpital Séjour/Consultation ambulatoire Chirurgical Procédure	Ouvrir Lésion/ Évacuation Blessure	Blessure orthopédique
Température de 100 °F ou plus avec ou sans symptômes			Avec ou sans Fièvre et/ou Gonflé Glandes				S'il s'accompagne de fièvre, de malaise, de maux de tête, de vomissements	La sclère est rose/  rouge, avec drainage		Pour des directives spécifiques pour Impétigo, Teigne, Gale- contactez le Infirmière scolaire	

## Capable de retourner à l'école

Test COVID fortement recommandé En cas

Sans fièvre sans utilisation de médicaments pendant 24 heures (c.-à-d. Tylenol, Motrin, Advil)	d'amélioration des symptômes et sans fièvre pendant 24 heures sans utilisation de médicaments. Des précautions supplémentaires doivent être prises, comme le port du masque et le maintien d'une distance sociale suffisante pendant les 5 prochains jours, conformément à la routine scolaire quotidienne recommandée.	Symptômes	Si elle est accompagnée de fièvre, elle ne doit pas avoir de fièvre pendant 24 heures sans utiliser de médicaments (par exemple Tylenol, Motrin, Advil)	En l'absence de symptômes pendant 24 heures.	L'élève peut retourner à l'école lorsque la peau est claire ou lorsque les symptômes sont certifiés par un médecin qui a déclaré que la condition n'est pas contagieuse pendant 24 heures.		avoir complété au moins 24 heures de traitement antibiotique, avoir complété les instructions de sortie et/ou être sans fièvre et avoir un billet du médecin pendant au moins 24 heures au moins, permettant un retour à l'école, indiquant toute réduction de la fièvre. médicament antibiotique requis. modifications	L'élève doit	La lésion doit pouvoir être recouverte de manière sûre et ne doit pas suinter, saigner ou suinter.	L'utilisation de béquilles, de bottes et/ou d'autres articles orthopédiques n'est autorisée qu'avec l'autorisation écrite d'un médecin. La documentation doit également inclure toutes les modifications scolaires nécessaires.
--	---	-----------	---	--	--	--	---	--------------	--	---

Pour obtenir des conseils supplémentaires, veuillez [consulter les conseils sur les virus respiratoires](#) & [Aperçu des conseils sur les virus respiratoires](#)